



Biopharma بيوفارما

شركة الإنتاج البيولوجية والصيدلانية البيطرية
SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES
ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

Km 2, route de Casablanca B.P. 4569 - Rabat - Akkari
Tél. : 00212 5 37 69 16 92 • Fax : 00212 5 37 69 16 89
e-mail : info@biopharma.ma

BIOPEST

Vaccin à virus vivant lyophilisé contre
la maladie de Newcastle
1000 DOSES

COMPOSITION : par dose vaccinale.

Virus vivant de la maladie de Newcastle souche Hitchner B1 $\geq 10^6$ EID₅₀

INDICATION :

Immunisation active des poulets et dindes contre la maladie de Newcastle.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Pour remettre en solution le vaccin, introduire 2ml de l'eau distillée dans le flacon contenant 1000 doses de vaccin lyophilisé à l'aide d'une seringue montée d'une aiguille. Dès solubilisation complète du vaccin, agiter légèrement pour homogénéiser puis prélever la totalité du liquide et le remettre en solution dans un flacon contenant 48 ml d'eau distillée. Renouveler une fois la même opération afin de récupérer le vaccin qui reste dans le flacon et dans la seringue ayant servi au transfert, le vaccin solubilisé est alors prêt à l'emploi.

• Voie intranasale par trempage du bec :

Reconstituer le vaccin dans 50ml d'eau distillée dans un flacon à col large. Tremper le bec jusqu'aux narines de façon à faire pénétrer la solution vaccinale dans les conduits nasaux.

• Voie oculaire :

Utiliser une tétine compte goutte lavée et stérilisée dans l'eau bouillante pendant 10 min. A l'aide de la tétine compte goutte, déposer une goutte de suspension vaccinale sur le globe oculaire.

Modalité de vaccination de masse

• Voie orale par incorporation dans l'eau de boisson :

Reconstituer le vaccin dans de l'eau propre non javellisée dans une quantité prévue pour une consommation dans une ou deux heures qui suivent la préparation.

Distribuer la solution vaccinale préparée juste après reconstitution à des oiseaux préalablement privés d'eau pendant 2 heures pour une absorption dans les deux heures qui suivent.

• Voie respiratoire par nébulisation :

Pulvériser la solution vaccinale préparée au-dessus des oiseaux à l'aide d'un pulvérisateur à pression, capable de produire des microgouttelettes.

PROGRAMME DE VACCINATION :

Le vaccin BIOPEST peut être utilisé à partir du premier jour d'âge

* Primo-vaccination : à partir de l'âge de un jour.

* Rappel à la 3^{ème} ou 4^{ème} semaine.

PRECAUTIONS :

Précautions d'emploi chez l'animal :

Ne pas utiliser du matériel stérilisé par des produits chimiques.

Ne vacciner que les sujets en bonne santé.

Utiliser de l'eau propre pour la dissolution.

Utilisation après reconstitution.

2 heures après ouverture du flacon et reconstitution du vaccin : mise en suspension.

Précautions d'emploi à prendre par la personne chargée de la vaccination :

Le virus de la maladie de Newcastle peut provoquer une conjonctivite transitoire chez l'homme. De ce fait, il est recommandé de manipuler la suspension vaccinale avec précautions et de protéger les yeux et les voies respiratoires par un équipement de protection adéquat.

Se laver les mains au savon et les désinfecter après la vaccination.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDESIRABLES :

Les animaux malades doivent être exclus de la vaccination.

DELAI D'ATTENTE : Zéro jour.

PRESENTATION : Flacon de 1000 doses de vaccin lyophilisé.

CONSERVATION : Entre +2°C et + 8°C à l'obscurité.



USAGE VETERINAIRE A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE