



Biopharma بيوفارما

شركة الإنتاج البيولوجية والصيدلانية البيطرية
SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES
ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

Km 2, route de Casablanca B.P. 4569 - Rabat - Akkari
Tél. : 00212 5 37 69 16 92 • Fax : 00212 5 37 69 16 89
e-mail : info@biopharma.ma

NewInVac

Vaccin à virus inactivé adjuvé contre
la maladie de Newcastle
1000 DOSES



COMPOSITION :

par dose vaccinale.

Virus inactivé de la maladie de Newcastle souche LaSota $\geq 50 DP_{50}$

INDICATION :

Immunisation active de l'espèce poule contre la maladie de Newcastle.

ESPECES CONCERNEES :

Espèce poule.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Vaccin en adjuvant huileux prêt à l'emploi.

Bien homogénéiser le flacon avant utilisation.

Poussins de un jour : 0,1 ml par oiseau.

Poulettes future pondeuse et reproductrices : 0,3 ml par oiseau.

Injection d'une dose vaccinale par oiseau, par voie intramusculaire au niveau du bréchet, ou par voie sous cutanée au niveau de la partie basse du cou.

L'injection par voie sous cutanée est pratiquée en pinçant entre le pouce et l'index la peau au niveau de la partie basse du cou, puis introduction de l'aiguille sous la peau dans le sens inverse de la tête du poussin et injection de la dose vaccinale recommandée.

PROGRAMME DE VACCINATION :

Primo-vaccination : Poussins en santé ayant un jour d'âge.

Le vaccin **NewInVac** peut être utilisé à partir du premier jour d'âge en association avec un vaccin vivant, souche HITCHNER B1 (ATLAVAC HB1) pour une protection durant toute la période de l'élevage.

Vaccination de rappel : Poulettes future pondeuse et reproductrices.

PRECAUTIONS :

Précautions d'emploi chez l'animal :

Utiliser du matériel stérile pour l'injection.

Bien agiter le flacon avant emploi.

Ne vacciner que les sujets en bonne santé.

Utilisation de tout le contenu après ouverture.

Précautions d'emploi à prendre par la personne chargée de la vaccination :

Ce vaccin contient de l'huile minérale, son injection accidentelle chez l'homme peut entraîner une douleur importante et de l'œdème qui peut induire une ischémie nécrosante.

En cas d'injection accidentelle au manipulateur, prévenir immédiatement un médecin même si la dose injectée est très faible. De ce fait, il est recommandé de manipuler la suspension vaccinale avec précautions au moment des injections.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDESIRABLES :

Les animaux malades doivent être exclus de la vaccination.

L'utilisation du vaccin n'est pas recommandée dans les 2 semaines avant le début de la ponte et pendant la ponte.

DELAÏ D'ATTENTE : Zéro jour.

PRESENTATION :

Flacon de 1000 doses de vaccin inactivé en adjuvant huileux.

CONSERVATION :

Entre +2°C et + 8°C à l'obscurité. Ne pas congeler.

USAGE VÉTÉRINAIRE A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE